

Pruebas rápidas de Retrovirus

Antes de realizar estas pruebas en nuestras colonias, debemos tener decidido de antemano cómo vamos a manejar a los gatos que den un resultado positivo. Si no es posible separar de forma humana y efectiva a los positivos de los negativos, no está justificado gastar inicialmente este dinero, sobre todo si va a significar una disminución de los fondos disponibles para esterilizaciones, desparasitaciones y/o alimento. Una alternativa es la creación de santuarios felinos (colonias donde sólo se destinan gatos positivos a según qué enfermedades).



Vacunaciones y desparasitaciones

1. Aunque sólo se vacune a un gato una vez, siempre es mejor que nada. Es posible que esto no sirva para evitar la presencia individual de algunas enfermedades en la colonia, pero puede evitar la aparición de epidemias.
2. Es compatible (y recomendable) realizar la vacunación y la desparasitación el día de la castración. Supone un estrés mucho menor que si repetimos la captura del gato.

La desparasitación, tanto interna como externa, tiene una gran importancia debido al potencial zoonótico de algunos agentes parasitarios que pueden estar presentes en las colonias felinas.

Este punto puede y debe ser utilizado en las reuniones con los vecinos para explicar por qué el manejo de una colonia por parte de profesionales revierte en una mejora para la salud pública de todo el vecindario.



Desde GEMFE-AVEPA, creemos que no es aceptable, éticamente, alimentar a los gatos de la calle sin proporcionarles además cuidados médicos, vacunación y esterilización. Esto sólo servirá para perpetuar la sobrepoblación y sus consecuencias negativas. Por este motivo instamos a las diferentes administraciones responsables, a las asociaciones pro-defensa de los gatos callejeros junto a sus veterinarios encargados y a las asociaciones de vecinos a trabajar unidos, para que esta tarea sea más productiva.

Páginas web de interés:

Página web de GEMFE, posicionamientos:

- http://avepa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128

Programa Koret de Medicina de Refugios, Universidad de Davis:

- <http://www.sheltermedicine.com/>

International Fund for Cat Welfare:

- <http://www.ifcw.net/>

Advisory Board on Cat Diseases:

- <http://abcd-vets.org/Guidelines/Pages/EN-Prevention-of-Infectious-Diseases-in-Cat-Shelters.aspx>

International Society of Feline medicine:

- <http://www.isfm.net/>

American Association of Feline Practitioners:

- <http://www.catvets.com/>



MANEJO DE LAS COLONIAS FELINAS



“ La interacción entre las poblaciones de gatos y humanos se ha dado durante toda la historia de la humanidad desde la aparición de las primeras ciudades. En los últimos años ha aumentado la concienciación social sobre el manejo humano y racional de estas poblaciones, denominadas habitualmente colonias. ”

Papel de los veterinarios clínicos en colaboración con asociaciones Pro-defensa de los gatos

El veterinario encargado debe diseñar un protocolo de actuación en la colonia que se realizará teniendo en cuenta el tamaño de la colonia y disponibilidad económica. Las actuaciones que deberán realizarse sobre los gatos son las siguientes:

1. Examen físico.
2. Esterilización con pequeño corte en la oreja.
3. Vacunación y desparasitación.
4. Prueba FeLV/FIV. Adopción/reubicación de los positivos.
5. Identificación mediante microchip.
6. Adopción de cachorros y de adultos socializados.
7. Regreso a la colonia de los no adoptables.


Serán priorizadas según el presupuesto de la colonia



Alimentación y eliminación

Los comederos se deben distribuir en 3 o más puntos según la cantidad de comensales y del espacio que dispongamos. Deberán estar situados lo más lejos posible de la zona de areneros y ubicados sobre superficies fáciles de desinfectar. Deben mantenerse muy limpios y asegurarnos que, una vez alimentados los gatos, no queda comida que pueda ser alimento de plagas como insectos y/o ratas.

Los areneros se deben disponer en zonas fáciles de acceder para limpiarlos frecuentemente (idealmente a diario), alejados del paso de peatones (que seguro agradecerán evitar según qué olores) así como alejados de los puntos de alimentación.



Limpieza y desinfección

La limpieza y la desinfección son dos de las tareas fundamentales que podemos llevar a cabo en una colonia. Estas medidas permiten que un número más grande de animales puedan convivir juntos en unas condiciones de higiene adecuadas, disminuyendo enormemente el contagio de enfermedades infecciosas y la sensación de suciedad del entorno. Esto es de gran importancia porque favorece la buena imagen delante del vecindario y disminuye la probabilidad de que aparezcan conflictos con éste.



Control de la natalidad

Numerosos estudios han demostrado que el mejor método para controlar la natalidad en la especie felina es la castración quirúrgica. En el caso de las colonias felinas, es especialmente importante realizarla antes de los 6 meses de edad, pues evitará la primera gestación de las gatas, que en situación de semilibertad se suele dar antes del año de vida. Estas intervenciones deben hacerse por un veterinario licenciado y colegiado en un quirófano estéril y con material quirúrgico adecuado. Es imprescindible contar con la presencia y uso de una fuente de oxígeno.

