

## CASELOG- GECAR

_ Nº caso	Identificación	Reseña	Motivo consulta	Pruebas Realizadas	Diagnóstico	Tratamiento	Complicaciones	Evolución
1	194420	8 años ME 25kg Boxer	Síncope	Hemat/Bioq, Uriana, T4 y TSH, ECG, Rx torácicas, Ecocar, Eco. Abd.	Fibrilación atrial secundaria a CMD	Furosemida Benaceprilo Pimobendan Digoxina	Persistencia de la taquicardia	Se solucionan los síntomas clínicos. La taquicardia se controla al añadir diltiazem Estable durante un año hasta que fallece por muerte súbita.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

### Lista de abreviaturas

ME: Macho Entero

Hema: Hematología

Bioq: Bioquímica

Uriana: urianálisis

T4: Tirosina total

TSH:

ECG: Electrocardiograma

Rx: Radiografías

Ecocar: Ecocardiografía

Eco.Abd: Ecografía abdominal

CMD: Cardiomiopatía Dilatada

**Tratamiento:** Se recomienda poner en el siguiente formato .... Principio activo + dosis en mg/kg/frecuencia de toma/vía de administración

PO: per os (vía oral)

SID: Una vez al día (cada 24 horas)

IV: Intravenoso

BID: Dos veces al día (cada 12 horas)

IM: Intramuscular

TID: Tres veces al día (cada 8 horas)

**CASELOG- GECAR**

SC: Subcutáneo

QID: Cuatro veces al día (cada 6 horas)